

# RACAN PÂTE BR 25

RATS NOIRS, RATS BRUNS ET SOURIS  
BRODIFACOUM 0,0025 %

**25  
PPM**



## Présentation du produit

Type de produit	TP14 – Rodenticide
Type de formulation	Appât en pâte, prêt à l'emploi (RB)
Substance active	Brodifacoum N°CAS 56073-10-0
Concentration	0,0025 % m/m
Amérisant	Benzoate de denatonium 10 ppm

## Informations réglementaires

Nom homologué	PATE BRODIF 25
N° d'AMM	FR-2015-0056 - Professionnels de la lutte contre les rongeurs
Organismes ciblés	Rats noirs ( <i>Rattus rattus</i> ) Rats bruns ( <i>Rattus norvegicus</i> ) Souris ( <i>Mus musculus</i> )
Application	Utilisation en intérieur et en extérieur, autour des bâtiments, en zones ouvertes et déchargées.

## Mode d'action

Le Brodifacoum est un anticoagulant de deuxième génération. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes quelques jours après ingestion de l'appât.

## Conditions et doses d'emploi

Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés ou des points d'appâts couverts et protégés.

**Contre les rats :** 100 g de produit espacés de 5 à 10 mètres.  
**Contre les souris :** 10 g de produit espacés de 3 à 5 mètres.

Inspecter les postes après 2 à 3 jours (souris) et 5 à 7 jours (rats) pour vérifier que l'appât est consommé, puis une fois par semaine. Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

**NE PAS utiliser en APPÂTAGE PERMANENT.**

## Référence et conditionnement

**Réf. R8960 :** Sachets de 10 g - Seau de 5 kg (Unité)

## Élimination

Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Éliminer les cadavres de rongeurs conformément à la réglementation locale. Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

## Précautions particulières

Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant. Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause.

**TP14 -** Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et pour l'environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : [fds@lodi.fr](mailto:fds@lodi.fr).

Les postes d'appâtage contenant **RACAN PÂTE BR 25** doivent être étiquetés avec les informations suivantes :

Nom du produit :	
<input type="text"/>	
Substance active :	Ne pas déplacer, ni ouvrir.
Difénacoum <input type="checkbox"/>	Contient un rodenticide.
Bromadiolone <input type="checkbox"/>	Antidote : Vitamine K1
Brodifacoum <input type="checkbox"/>	En cas d'incident, contacter un centre antipoison.
Autre <input type="checkbox"/>	N°ORFLA : +33 (0)1 45 42 59 59
<input type="text"/>	